

除草剤でサシバエ対策!!

土壌処理除草剤

農林水産省登録
第22908号

ホクコー
**ダイロン
ゾル**



500ml入

茎葉処理除草剤

農林水産省登録
第22902号

ホクコー
ザクサ
液剤



500ml入

®は三井化学クロップ&ライフソリューション
株式会社の登録商標

サシバエについて



- ・ウシやヒトを吸血する害虫。
吸血時の痛みによる多大なストレスに加え、
ウィルスや寄生虫、細菌を媒介する。
- ・3～7匹/脚の吸血で飼料効率が顕著に低下。
50匹/牛で13.2%体重が減少する。
- ・涼しい時間に活動し、日中は畜舎周辺の
葉陰で休息するため畜舎周辺の除草が重要。

サシバエの 休息箇所を減らす事 が重要!!

畜舎周辺*の除草 がサシバエの温床を減らすのに有効です

近接畜舎にて同じ時期に試験した事例 ※牛舎から1m離して散布してください。



除草あり畜舎
(個体数：2匹)

除草なし畜舎
(個体数：64匹)

混合薬液の調合早見表

ザクサ100倍、ダイロンゾル400倍の場合

希釈水量	5ℓ	10ℓ	20ℓ	100ℓ	200ℓ
ザクサ液剤(100倍)	50mℓ	100mℓ	200mℓ	1ℓ	2ℓ
ダイロンゾル(400倍)	12.5mℓ	25mℓ	50mℓ	250mℓ	500mℓ
散布できる面積	50㎡	100㎡	200㎡	1000㎡	2000㎡

効果を高めるポイント

1 ダイロン+ザクサを**土壌表面にも**しっかり散布してください。
散布ムラがあると効果不足の原因になります。
(雑草の大きさの目安として草丈15cm以下)

草むらにノズルをつっこんで、
土壌にも散布してください！





雑草が繁茂している場合は一度
ザクサ液剤のみで枯らして下さい。

ザクサ液剤+ダイロンゾルを散布する時は雑草の草丈が15cm以下、
土が見えている状態で散布してください。

2 散布ノズルは泡状に薬液が吐出する
キラナシノズルがおすすめです。

少量散布用ノズル (ラウンドノズル) では
効果が劣ります！



散布時の注意

1. 激しい降雨が予想される場合は、使用を避けてください。
2. 作物に薬液が付着すると薬害を生じるので、飛散しないように散布してください。
3. 散布区域外へのドリフト、流入に注意してください。薬害が生じる場合があります。

【適用内容】(樹木等の適用のみ掲載)

2025年2月末日現在の適用内容

薬剤名	作物名	適用雑草名	使用時期	使用量(10a当り)		本剤の 使用回数	使用方法				
				使用量	希釈水量						
ダイロン ゾル	樹木等*	一年生雑草	雑草発生前～ 生育初期	1000～ 2000ml	100ℓ	3回以内	植栽地を除く樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布 又は全面土壌散布				
		コケ類	コケ類生育期	500～ 1000ml	100～ 200ℓ						
		イシクラゲ	イシクラゲ生育期								
ザクサ 液剤		一年生雑草	雑草生育期	雑草生育期				1000～ 2000ml	100～ 200ℓ	3回以内	植栽地を除く樹木等の 周辺地に 雑草茎葉散布
		多年生雑草									

※適用場所は公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等

DCMUを含む農業の総使用回数:3回以内、グルホシネート及びグルホシネートPを含む農業の総使用回数:3回以内

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 散布器具はよく洗浄してください。